

KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU Wczesnego wykrywania raka jelita grubego

W programie mogą wziąć udział:

1. Osoby w wieku 50-65 lat,
2. Osoby w wieku od 40 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego, I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
3. Osoby w wieku od 25 lat z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie z potwierdzeniem obciążenia genetycznego z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane badania, co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych. Osoba taka może być zwolniona z wykonywania badań kontrolnych.

Osoby spełniające powyższe warunki wiekowe, muszą dodatkowo spełniać warunki:

1. Nieobecność krwi w stolcu, (jeśli przyczyną krwawień są hemoroidy / żylaki odbytu / pacjent może wziąć udział w programie),
2. Brak wyraźnej zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich miesięcy (np. pojawienie się biegunek lub zaparć, bez wyraźnego powodu),
3. Brak chudnięcia lub niedokrwistości, stwierdzonej w badaniach krwi (gdy przyczyna tych objawów jest niewyjaśniona),

W programie nie mogą brać udziału osoby, które:

1. Miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat,
2. Mają objawy kliniczne, sugerujące istnienie raka jelita grubego.

Do badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza, gdyż kwalifikacja następuje na podstawie ankiety do Programu Badań Przesiewowych

W ramach programu zapewniane jest:

1. Bezpłatne wykonanie badania kolonoskopii diagnostycznej,
2. Pobranie wycinków oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu
3. Polipektomię (usunięcie polipów o wielkości do 10mm oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu)
4. Preparat, którym należy przygotować się do badania, (za preparat pobierana jest kaucja w wysokości 80zł, zwracana w dniu badania).
5. Bezpłatne znieczulenie/(sedacja) dla 20% osób, ogólnego limitu przyznanych badań, prawo do bezpłatnego znieczulenia mają osoby:
 - po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,
 - po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości.